

ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและยับยั้งเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดสจากสารสกัดผักพื้นบ้านในจังหวัดพัทลุง

Antioxidant and α -glucosidase inhibitory activities from local vegetables in Phatthalung Province

วิชุดา กล้าเวช^{1*} สายารีตี เจ็ตตาเหง² ศิรญาพร เจียมทองครี³ และ ปรีณา ดิกิจ⁴

¹ อาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดพัทลุง 93110

² นักศึกษา สาขาวิชาชีววิทยาและชีววิทยาประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จังหวัดสงขลา 90000

³ นักศึกษา สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดพัทลุง 93110

⁴ อาจารย์ สาขาวิชาชีววิทยาและชีววิทยาประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จังหวัดสงขลา 90000

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและการยับยั้งเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดสจากสารสกัดทั้งสดและแห้งของผักพื้นบ้าน 9 ชนิดใน อำเภอกรรา จังหวัดพัทลุง ได้แก่ ใบจิกนา (*Barringtonia acutangula* (L.) Gaertn.) เปลือกเนียง (*Archidendron jiringa* Nielsen) ใบเนียงรอก (กำลังตรวจสอบชื่อวิทยาศาสตร์) ฝกเพกา (*Oroxylum indicum* (L.) Kurz) ผลมะเดื่อกรวด (*Ficus semicordata* J.E.Smith) ผลมะเดื่อจั่ว (*Ficus oligodon* Mig) ผลมะเดื่อชื่น้อย (*Ficus sp.*) ผลมะเดื่อไป๋ (*Ficus obpyramidata* King) และผลมะเดื่อฉิ่ง (*Ficus fistulosa* Reinw) โดยศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH พบร่วงสารสกัดจากเพกาแห้งมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสูงสุด โดยกำจัดสารต้านอนุมูลอิสระร้อยละ 92.25 นอกจากนี้กิจกรรมการยับยั้งเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดสโดยเปรียบเทียบกับยารักษาโรคเบาหวาน Acarbose[®] พบร่วงผลมะเดื่อชื่น้อยแห้งมีกิจกรรมการยับยั้งเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดสสูงสุด โดยมีการยับยั้งเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดสร้อยละ 85.46 ดังนั้นมีความเป็นไปได้ที่จะนำผักพื้นบ้านเหล่านี้ไปใช้เป็นอาหารเสริมสุขภาพต่อไปในอนาคต

Abstract

The objective of this research was to evaluate the antioxidant and α -glucosidase inhibitory activities of 9 fresh and dried local vegetables extract from Kong Ra District, Phatthalung Province, such as *Barringtonia acutangula* (L.) Gaertn., *Archidendron jiringa* Nielsen, Scientific name: in process (Neang-rok: local name), *Oroxylum indicum* (L.) Kurz, *Ficus semicordata* J.E.Smith, *Ficus oligodon* Mig, *Ficus sp.*, *Ficus obpyramidata* King and *Ficus fistulosa* Reinw. The antioxidant activities were determined by DPPH radical scavenging. Results indicated that dried crude extract of *Oroxylum indicum* (L.) Kurz exhibited the highest DPPH radical scavenging activity at the final concentration of 5 mg/ml, revealed the DPPH activity as 92.25%. Moreover, the extracts were studied for their α -glucosidase inhibitory activities compare with authentic drug, Acarbose[®]. Results indicated that dried crude extract of *Ficus sp.* exhibited the highest inhibitory activity, revealed the inhibition activity as 85.46%. Thus, these local vegetable might be possible new sources of α -glucosidase inhibition and antioxidants so there are suitable for use as functional food in the future.

คำสำคัญ : จังหวัดพัทลุง สารสกัดผักพื้นบ้าน ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ยับยั่งเอนไซม์แอลไฟ-กลูโคซิเดส อำเภอกรา

Keywords : Antioxidant, α -glucosidase inhibition, Kong-hra District, Local vegetable crude extract, Phatthalung Province

*ผู้นิพนธ์ประธานงานประชุมนี้คือ เล็กทรอนิกส์ wichudaklawech@gmail.com โทร. 0 7460 9600 ต่อ 2275 และ 2211

1. บทนำ

ความหลากหลายทางชีวภาพของผักพื้นบ้านในภาคใต้มีสูงมาก สังเกตได้จากการพื้นเมืองของคนภาคใต้จะมีพืชผักพื้นบ้านเป็นส่วนประกอบหลัก ในอาหารหนึ่งอย่างนั้นจะประกอบด้วยผักหลากหลายชนิด ผักแต่ละชนิดนั้นล้วนมีสารสำคัญและสารที่ร่างกายต้องการที่แตกต่างกันออกไป เช่น เกลือแร่ วิตามิน อยู่เป็นจำนวนมาก ผักพื้นบ้านที่มีสีเขียวและรสเผ็ดจะมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงมาก มีทั้งวิตามินเอ วิตามินซี และเบต้าแคโรทีน วิตามินบี และเบต้าแคโรทีน วิตามินบี๖ ฯลฯ ในย่างาง ใบชะพลู ยอดและใบต่ำสั้น ผักกุด ผักแพะ ผักชีลา ผักแคร่ ใบบัวบก ใบเหมียง ใบกระเจี๊ยบ ใบแมงลัก แครอท ดอกชี้เหล็กใบเหมียง ผักหวาน ผักเชียงดา ผักต้า ยอดแค ใบกระเพรา ใบชี้เหล็ก และผักกะเจด เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีผักอื่นๆ ที่มีวิตามินเอ ได้แก่ ผักปลั้ง ผักหวาน ดอกชี้เหล็ก ยอดกระติมน ใบชะมวง ผักหนาม ผักเอื้อด และผักชีฟรัง เป็นต้น การรักษาโรคไขมันเลือดสูง ความดันเลือดสูง โรคหัวใจ และโรคเบาหวาน จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรับสารต้านอนุมูลอิสระปริมาณสูง การกินผักพื้นบ้านที่อุดมด้วยสารเหล่านี้ จึงช่วยรักษาโรคกลุ่มนี้ได้โดยรวม (อ้วมใจ, 2552) อำเภอกรา จังหวัดพัทลุงเป็นพื้นที่หนึ่งที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่ยังไม่ถูกทำลายอยู่มาก วิถีชีวิตร่องรอยนั้นยังไม่เปลี่ยนแปลง ทำให้ยังคงเห็นการพึ่งพาธรรมชาติในชีวิตประจำวัน เช่น การเก็บผักพื้นบ้านมารับประทานหรือรักษาโรค มีทั้งปลูกเองและเก็บขึ้นเองตามธรรมชาติ ประกอบกับภูมิปัญญาได้ทำงานวิจัยเรื่อง ผักพื้นบ้าน จากป่าคุณค่าสูงมาก เมื่อปี พ.ศ. 2552 พบผักพื้นบ้านทั้งสิ้น 206 ชนิด แต่ยังขาดข้อมูลด้านฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของผักพื้นบ้านอีกหลายชนิด ดังนั้นทีมผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะทำการศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH และฤทธิ์ในการยับยั่งเอนไซม์แอลไฟ-กลูโคซิเดส ซึ่งเอนไซม์และสารเคมีที่อยู่ในผักพื้นบ้าน เช่น ผักชี ผักชีฟรัง ผักชีเขียว ผักชีเขียวญี่ปุ่น ผักชีฟรังญี่ปุ่น ฯลฯ สามารถใช้ในการรักษาโรคต่างๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคกระเพาะปัสสาวะ โรคผิวหนัง ฯลฯ ที่มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อ หรือภาวะอุดตันในเส้นเลือด ทำให้สามารถลดความเสี่ยงของการติดเชื้อ ลดความเสี่ยงของการอุดตันในเส้นเลือด ลดความเสี่ยงของการเป็นโรคร้ายแรง เช่น โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง ฯลฯ ได้

2. วิธีการทดลอง

2.1 รวบรวมและตรวจสอบข้อมูลทางคุณสมบัติของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของผักพื้นบ้าน

ทำการตรวจสอบคุณสมบัติของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของผักพื้นบ้านตระกูลมะเดื่อที่สำรวจพบในอำเภอกรา จังหวัดพัทลุง โดย อ้างอิงจากหนังสือ 4 เล่ม ได้แก่ สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (2540) สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล (2540) กองโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (2544) และ ผัก 333 ชนิด คุณค่าอาหารและการกิน (2550) นอกจากหนังสือทั้ง 4 เล่มข้างต้นแล้ว ยังสืบค้นข้อมูลจากรายงาน สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ และเว็บไซต์ต่างๆ ในอินเทอร์เน็ต เป็นต้น โดยใช้เกณฑ์ที่ว่าจะเดื่อชนิดนั้นๆ ยังไม่มีรายงานสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ

2.2 การเตรียมตัวอย่างสารสกัดทรายผักพื้นบ้านที่คัดเลือกได้

2.2.1 นำขี้นส่วนผักพื้นบ้านที่คัดเลือกได้มาทำการล้างด้วยน้ำสะอาด ผึ่งลมให้แห้งนำม้าชั่งน้ำหนัก แบ่งออกเป็น 2 ส่วน เพื่อนำมาสกัดแบบสดและแห้ง

2.2.2 แบบสดนำไปปูนให้ละเอียดด้วยเครื่องบดละเอียดไฟฟ้า เก็บพืชที่บดละเอียดแล้วใส่ในบีกเกอร์ที่แห้ง ปิดด้วยพาราฟิล์ม เพื่อนำไปสกัดสาร

2.2.3 แบบแห้งนำตัวอย่างพืชเข้าตู้อบพร้อนไม้ โดยใช้อุณหภูมิประมาณ 60 องศา-เซลเซียส อบจนแห้งสนิทใช้เวลาประมาณ 2 วัน

2.2.4 ตัวอย่างแบบแห้งเมื่อแห้งแล้วนำมาซึ่นเดียวกับแบบสด

2.2.5 การสกัดสารจากผักพื้นบ้านที่คัดเลือกได้

(1) ชั่งผักพื้นบ้านที่ต้องการ น้ำหนัก 50 กรัม ใส่ในขวดรูปทรงพู่ขนาด 250 มิลลิลิตร

(2) เติมตัวทำละลายอทานอลร้อยละ 95 ในอัตราส่วน 1:3 นำไปบนเครื่องเย่า เย่าเป็นเวลา 24 ชั่วโมง

(3) ตะกอนที่เหลือนำไปสกัดซ้ำอีก 1 ครั้ง ในอัตราส่วนเดิม เย่าเป็นเวลา 3 ชั่วโมง

(4) นำของเหลวที่กรองได้ทั้งหมดไปกรองด้วยกระดาษกรอง Whatman No.1

(5) นำสารละลายที่กรองได้ไปรheyด้วยตัวทำละลายอทานอลออกด้วยเครื่องหมุนระเหย

(6) นำสารสกัดไปวางไว้ในโถดูดความชื้นอีกรั้ง เพื่อให้ตัวทำละลายระเหยออกหมด สารที่ได้จะมีลักษณะข้นหนืด จากนั้นนำไปซึ่งน้ำหนักสารสกัดทรายที่ได้

2.3 การหาปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี 2, 2 diphenyl - 1- picrylhydrazyl radical scavenging activity (DPPH) ดัดแปลงจากวิธีของ (Yen and Wu, 1999)

2.3.1 เตรียมสารละลายที่ได้จากการสกัดในข้อ 2 ให้มีความเข้มข้นต่างๆ โดยใช้ DMSO ในการเตรียม stock solution

2.3.2 นำสารสกัดที่ความเข้มข้นที่เตรียมได้ไปวัดค่าการดูดกลืนแสง (absorbance) ที่ความยาวคลื่น 540 นาโนเมตร ด้วยเครื่อง ELISA reader

2.3.3 เตรียมส่วนผสมเพื่อนำไปวิเคราะห์กับเครื่อง Microplate reader โดยปีเปตัน้ำก้านปริมาตร 25 ไมโครลิตรลงใน 96 well plate แล้วปีเปตเมนทานอลความเข้มข้นร้อยละ 50 ปริมาตร 225 ไมโครลิตร ตามด้วยปีเปตตัวอย่างสารสกัดปริมาตร ปริมาตร 25 ไมโครลิตร แล้วจึงเติมสาร DPPH ที่ละลายอยู่ในเมทานอลความเข้มข้นร้อยละ 100 ปริมาตร 25 ไมโครลิตร ตามลำดับ โดยจะมีปริมาตรรวมทั้งหมด 300 ไมโครลิตร ทำการทดสอบ 3 ชั้า ในสารแต่ละความเข้มข้น ทดสอบจนได้ค่ากิจกรรมการยับยั้งเท่ากับร้อยละ 50 หรือ IC₅₀ ของแต่ละสารสกัดตัวอย่าง

2.3.4 นำข้อมูลมาหาค่าเฉลี่ย แล้วคำนวณร้อยละการกำจัดอนุมูลอิสระ หรือ % radical scavenging จากสมการ

$$\% \text{DPPH} = [(OD_{\text{Blank}} - OD_{\text{Sample}}) / OD_{\text{Blank}}] \times 100$$

เมื่อ OD_{Blank} = ค่าการดูดกลืนแสงของตัวควบคุม

OD_{Sample} = ค่าการดูดกลืนแสงของสารตัวอย่าง

2.3.5 หาปริมาณการต้านอนุมูลอิสระของสารต้านอนุมูลอิสระสังเคราะห์ ทำการทดลองเช่นเดียวกับข้อ 3.2 แต่เปลี่ยนจากสารสกัดพืชตัวอย่างเป็นสารต้านอนุมูลอิสระสังเคราะห์ ที่ความเข้มข้น 0 20 30 40 50 และ 60 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร เพื่อนำมาทำการฟมาตรฐาน

2.4 การทดสอบฤทธิยับยั้งเอนไซม์แอลfaoglูโคสิเดสของสารสกัดผักพื้นบ้านที่คัดเลือกได้

2.4.1 เตรียมสารสกัดทรายผักพื้นบ้านที่คัดเลือกได้ในข้อ 2.2 ที่ความเข้มข้น 1 2 และ 4 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร

2.4.2 เติมส่วนผสม (Lebowitz และคณะ, 1998) ดังนี้

1) *p*-nitrophenyl- α -D-glucopyranoside (PNP-G) 950 μ l

2) เอนไซม์แอลfaoglูโคซิเดส (1 unit/ml) 4 μ l

3) สารสกัดผักพื้นบ้าน

1 μ l

2.4.3 ทำการผสมส่วนผสมในข้อ 2.4.2 ให้เข้ากัน จากนั้นนำไปปั่นในอ่างควบคุมอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 20 นาที

2.4.4 จากนั้นเติมสารละลาย Na_2CO_3 100 μl และนำไปวัดด้วยเครื่อง UV-visible spectroscopy โดยวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 405 nm และใช้ DMSO เป็น blank โดยเปรียบเทียบกับสารมาตรฐาน Acarbose® ซึ่งเป็นยารักษาโรคเบาหวาน นำไปคำนวณหาร้อยละของการยับยั้ง (% inhibition) โดยคำนวณได้จากสมการต่อไปนี้

$$\% \text{ inhibition} = \frac{(A_{\text{blank}} - A_{\text{sample}})}{A_{\text{blank}}} \times 100$$

โดย: A_{blank} คือ ค่าการดูดกลืนแสงของสารละลาย DMSO

A_{sample} คือ ค่าการดูดกลืนแสงของสารละลายตัวอย่างผักพื้นบ้าน

3. ผลการทดลองและวิจารณ์ผล

3.1 การหาปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี 2, 2 diphenyl - 1- picrylhydrazyl radical scavenging activity (DPPH)

จากการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์การจำจัดสารต้านอนุมูลอิสระโดยวิธี DPPH ในผักพื้นบ้าน 9 ชนิด ดังนี้ จิกนา เนียง เนียงรอก เพกา มะเดื่อกรวด มะเดื่อจ้ำง มะเดื่อโ派人 และฉิ่ง จากตารางที่ 1 พบว่าผักพื้นบ้านที่คัดเลือกได้ มีคุณสมบัติในการจำจัดสารต้านอนุมูลอิสระอยู่ในสารสกัดหายาบทั้งในสารสกัดแบบสด และแบบแห้ง นอกจากรากน้ำบางชนิดผักพื้นบ้าน เช่น ฝักเพกา ทั้งสารสกัดหายาสด และแห้งมีกิจกรรมการจำจัดสารต้านอนุมูลอิสระสูง ถึงร้อยละ 90.70 ± 0.29 และ 92.25 ± 0.33 ตามลำดับ การวิเคราะห์ฤทธิ์ต้านสารอนุมูลอิสระในผักพื้นบ้านครั้งนี้ใช้วิธี 2,2-diphenyl-l-picrylhydrazyl radical (DPPH) ซึ่งมีสาร ascorbic acid เป็นสารมาตรฐาน ซึ่งแตกต่างกับรายงานของเกศิณี และจันทร์เพ็ญ (2542) ซึ่งทำการศึกษาศักยภาพในการต้านสารอนุมูลอิสระของสารสกัดผักพื้นบ้านไทย ด้วยวิธีเบتا-คาโรทีน บลิชซิ่ง โดยมีสาร butylated hydroxyanisole (BHA) เป็นสารมาตรฐาน เมื่อวิเคราะห์ผลการทดลองโดยเน้นเฉพาะในผักพื้นบ้านภาคใต้ พบร่วมกับสารต้านอนุมูลอิสระที่มีมากกว่า 100 มิลลิกรัม สาร BHA เทียบเท่าในผักสด 100 กรัม

ตารางที่ 1 กิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระของผักพื้นบ้านที่คัดเลือกได้

ชนิดสารสกัดผักพื้นบ้าน	กิจกรรมการกำจัดสารอนุมูลอิสระ (โดยวิธี DPPH) (%)		ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์แอลฟากลูโคสิเดส (% inhibition)
	ตัวอย่างแบบสด	ตัวอย่างแบบแห้ง	
จิกนา (ใบ)	74.61±0.73	63.95±0.29	10.78
เนียง (เปลือก)	84.78±0.44	ND*	6.9
เนียงรอก (ใบ)	74.90±0.73	55.13±1.02	0
เพกา (ฝัก)	90.70±0.29	92.25±0.33	4.54
มะเดื่อกรวด (ผล)	81.49±0.44	32.66±0.44	5.09
มะเดื่อจัง (ผล)	54.84±0.93	71.12±0.34	3.46
มะเดื่อชิน้อย (ผล)	91.57±0.29	57.66±0.61	23.54
มะเดื่อโป๊ะ (ผล)	52.72±0.44	53.10±0.34	0
มะเดื่อฉิ่ง (ผล)	15.20±0.00	13.50±0.00	0

หมายเหตุ : ND* หมายถึง ไม่ได้ทำการวิเคราะห์

3.2 การทดสอบฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์แอลฟากลูโคสิเดสของสารสกัดผักพื้นบ้านที่คัดเลือกได้

จากการที่นำสารสกัดจากผักพื้นบ้านมาทดสอบฤทธิ์การยับยั้งเอนไซม์แอลฟากลูโคสิเดสโดยเปรียบเทียบกับสารมาตรฐาน Acarbose® ซึ่งเป็นยารักษาโรคเบาหวาน พบว่าสารสกัดจากผลไม้เดื่อชิน้อยแห้งแสดงฤทธิ์ในการยับยั้งเอนไซม์แอลฟากลูโคสิเดสได้ดีที่สุดที่ความเข้มข้น 2 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร โดยการยับยั้งเอนไซม์แอลฟากลูโคสิเดสเพื่อใช้สำหรับโรคเบาหวาน ลดลงมาเหลือ 10.78% ขณะที่ความเข้มข้น 50.22 รองลงมาคือ ใบจิกนาสดมีร้อยละของการยับยั้งเอนไซม์แอลฟากลูโคสิเดสเท่ากับ 21.12% ที่ระดับความเข้มข้นเดียวกัน (ตารางที่ 2) ซึ่งผลการทดสอบนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของวิมลพรรณ และคณะ (2553) ซึ่งทำการทดสอบฤทธิ์การยับยั้งเอนไซม์แอลฟากลูโคสิเดสของพืชสมุนไพรเพื่อใช้บำบัดโรคเบาหวาน พบว่าสารสกัดจากกระดุมทองเดื่อยมีฤทธิ์ในการยับยั้งเอนไซม์แอลฟากลูโคสิเดสได้ดีที่สุดที่ความเข้มข้น 1.0 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร โดยมีร้อยละของการยับยั้งเอนไซม์แอลฟากลูโคสิเดสคิดเป็นร้อยละ 99.22 รองลงมาได้แก่ สารสกัดจากแพะต่ำสิ่ง อินทนิน มีร้อยละของการยับยั้งเอนไซม์แอลฟากลูโคสิเดสเท่ากับ ร้อยละ 27.52 และ 22.39 ตามลำดับที่ความเข้มข้นเดียวกัน นอกจากนี้สารสกัดเมทานอลของมะรุมยังมีฤทธิ์ในการยับยั้งเอนไซม์แอลฟากลูโคสิเดส โดยพบว่าที่ความเข้มข้น 1.0 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร มีร้อยละการยับยั้งเท่ากับ 50.84 (วิมลพรรณ และคณะ, 2552)

4. สรุป

จากการสำรวจข้อมูลนิดของผักพื้นบ้านในพื้นที่อำเภอกรุงเทพฯ จังหวัดพัทลุง โดยเน้นผักพื้นบ้านที่มีคุณสมบัติในการลดน้ำตาลในเลือด หรือมีการนำไปใช้ในการรักษาอาการเบาหวาน โดยมีหมวด และประชารษฎาบ้านเป็นที่มีวิจัยร่วมพบร่วมกัน 9 ชนิด ดังนี้ จิกนา เนียง เนียงรอก เพกา มะเดื่อกรวด มะเดื่อจัง มะเดื่อชิน้อย มะเดื่อโป๊ะ และฉิ่ง จากนั้นทำการวิเคราะห์การกำจัดสารต้านอนุมูลอิสระโดยวิธี DPPH ในผักพื้นบ้าน 9 ชนิด พบว่าผักพื้นบ้านที่คัดเลือกได้มีคุณสมบัติในการกำจัดสารต้านอนุมูลอิสระอยู่ในสารสกัดหยาบทั้งในสารสกัดแบบสด และแบบแห้ง อีกทั้งบางชนิดผักพื้นบ้าน เช่น ฝักเพกา ทั้งสารสกัดหยาบทั้งในสารสกัดแบบสด และแห้งมีกิจกรรมการกำจัดสารต้านอนุมูลอิสระสูงถึงร้อยละ 90.70±0.29 และ 92.25±0.33 ตามลำดับ นอกจากนี้เมื่อนำสารสกัดจากผักพื้นบ้านมาทดสอบฤทธิ์การยับยั้งเอนไซม์แอลฟากลูโคสิเดสโดยเปรียบเทียบกับสารมาตรฐาน Acarbose® ซึ่งเป็นยารักษาโรคเบาหวาน พบว่าสารสกัดจากผลไม้เดื่อชิน้อยแห้งแสดงฤทธิ์ในการยับยั้งเอนไซม์แอลฟากลูโคสิเดสได้ดีที่สุดที่ความเข้มข้น 2 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร โดยการยับยั้งเอนไซม์แอลฟากลูโคสิเดสคิดเป็นร้อยละ 50.22 รองลงมาคือ ใบจิกนาสดมีร้อยละของการยับยั้งเอนไซม์แอลฟากลูโคสิเดส

-varasariwachiratiporn
การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5

เท่ากับ 21.12 ที่ระดับความเข้มข้นเดียวกัน จากผลการทดสอบดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าผักพื้นบ้านเหล่านี้มีความเหมาะสมในการนำไปใช้เป็นอาหารเสริมสุขภาพที่มีผลต่อการบำบัดป้องกันโรคเบาหวานได้ในระดับหนึ่ง

ตารางที่ 2 ฤทธิ์การยับยั้งเอนไซม์แอลฟากลูโคสิเดสของสารสกัดจากผักพื้นบ้าน

ชื่อพืช	ความเข้มข้น	% inhibition	ชื่อพืช	ความเข้มข้น	% inhibition
ใบจิกนาสด	1	10.78	ผลมะเดื่อกรวด	1	5.09
	2	21.12		2	9.88
	4	50.06		4	15.13
ใบจิกนาแห้ง	1	7.8	ผลมะเดื่อจั่วแห้ง	1	3.46
	2	15.2		2	5.89
	4	32.5		4	9.1
ผลเนียงสด	1	6.9	ผลมะเดื่อชีน้อย	1	23.54
	2	13.54		2	50.22
	4	26.99		4	85.46
ผักเพกาแห้ง	1	4.54	Acarbose	1	56.33
	2	8.96		2	88.67
	4	17.62		4	99.25

5. กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบพระคุณคณะผู้ร่วมวิจัยทุกท่านที่ทั้งนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยทักษิณและ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา รวมถึงนักวิจัยจากชุมชนอำเภอทางรา จังหวัดพัทลุง ที่ร่วมกันดำเนินการวิจัยครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี งานวิจัย ขึ้นนี้ได้รับแหล่งทุนอุดหนุนจากโครงการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนเครือข่ายการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง ประจำปีงบประมาณ 2554

6. เอกสารอ้างอิง

- เกศศิลป์ ตระกูลพิทักษ์ และจันทร์เพ็ญ ศักดิ์สิทธิพิทักษ์. 2542. ศักยภาพในการต้านสารอนุมูลอิสระของสารสกัดจากผักพื้นบ้านไทย. สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. หน้า 13-23.
- วิมลพรรณ รุ่งพรหม, ศิริรัตน์ ศิริพรวิศาล, สัญญา เกี้ยวไสว และ มุกดา ทรงไตรย. 2553. สารยับยั้งเอนไซม์แอลฟากลูโคสิเดสจากพืชสมุนไพรเพื่อใช้บำบัดโรคเบาหวาน. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (ฉบับพิเศษ). 41(3/1): 301-304.
- วิมลพรรณ รุ่งพรหม, ศิริรัตน์ ศิริพรวิศาล และสมฤตี เลี่ยมทอง. 2552. สารยับยั้งเอนไซม์แอลฟากลูโคสิเดสจากมะธุร. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (ฉบับพิเศษ). 40(3): 49-52.
- อ้อมใจ วงศ์มนษา. (2551). ผักพื้นบ้านและอาหารพื้นเมืองในการรักษาโรค. สืบค้นเมื่อ 30 สิงหาคม 2552 เข้าถึงได้จาก <http://gotoknow.org/blog/omjai-w/18872>
- Johnston, P.S., Coniff, R.F., Hoogwerf, B.J. Santiago, J.V. and Pi-Sunyer, F.X.A. 1994. Effect of the carbohydrazine inhibitors miglitol in sulfonylurea-treated NIDDM patients. *Diabetes Care*. 17: 20-29.
- Lebowitz, H.E. 1998. α -glucosidase inhibitors as agents in the treatment of diabetes. *Diabetes Rev.* 6: 132-145.
- Yen, G. and Wu, J. (1999). Antioxidant and radical scavenging properties of extract from *Ganoderma tsugae*. *Food Chem.* 65: 375-379.